

Ernährungswissenschaftliche und klinische Beurteilungen

UNTERSCHIEDUNGSMERKMALE VON DURCHFALL DES DÜNN- UND DICKDARMS

Faktor	Dünndarm*	Dickdarm*
Kot		
Menge	Normal bis stark erhöht	Normal bis vermindert
Konsistenz	Sehr wässrig bis wenig geformt (typischer Kotwert 6 oder 7)	Geringfügig geformt, dickflüssig (typischer Kotwert 4 oder 5)
Blut	Falls vorhanden, dunkel oder schwarz, teerartig aussehend	Falls vorhanden, hellrot, frisch aussehend
Schleim	Selten	Häufig
Farbe	Wechselnd	Normal
Fett	Möglicherweise vorhanden	Nicht vorhanden
Kotabsatz		
Tenesmus (Anstrengung bei der Ausscheidung)	Nicht vorhanden	Vorhanden
Dringlichkeit	Normal bis leicht erhöht	Deutlich erhöht
Häufigkeit	Normal bis erhöht	Deutlich erhöht
Anzeichen		
Erbrechen	Tritt möglicherweise auf	Selten
Blähungen	Möglicherweise vorhanden	Selten
Appetit	Normal, verringert oder erhöht	Üblicherweise normal
Gewichtsverlust	Häufig	Selten
*In einigen Fällen sind sowohl der Dünndarm als auch der Dickdarm betroffen, und die klinischen Anzeichen sind unterschiedlich.		

Literatur

Tams, T. R. (1996). Gastrointestinal symptoms. In T. R. Tams (Ed.), *Handbook of small animal gastroenterology* (pp. 44-45). Saunders.

Hall, E. J., & Day, M. J. (2017). Diseases of the small intestine. In S. J. Ettinger, E. C. Feldman, & E. Côté (Eds.), *Textbook of veterinary internal medicine: Diseases of the dog and the cat* (8th ed., p. 3669). Elsevier.