

Avaliações nutricionais e clínicas

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DA DIARREIA DO INTESTINO DELGADO E GROSSO

Fator	Intestino delgado*	Intestino grosso*
Fezes		
Volume	Normal a muito maior	Normal a diminuído
Consistência	Muito aquosa a semiformada (pontuação fecal típica 6 ou 7)	Semiformado, gelatinoso (pontuação fecal típica 4 ou 5)
Sangue	Se presente, escuro ou preto, com aparência de piche	Se presente, vermelho brilhante, com aparência de fresco
Muco	Incomum	Frequente
Cor	Variável	Normal
Gordura	Pode estar presente	Ausente
Defecação		
Tenesmo (esticamento)	Ausente	Presente
Urgência	Normal a levemente aumentada	Acentuadamente aumentada
Frequência	Normal a aumentada	Acentuadamente aumentada
Sinais relacionados		
Vômito	Pode estar presente	Incomum
Flatulência	Pode ocorrer	Incomum
Apetite	Normal, diminuído ou aumentado	Normalmente normal
Perda de peso	Comum	Incomum
* Em alguns casos, o intestino delgado e o grosso são afetados, e os sinais clínicos variam.		

Referências

Tams, T. R. (1996). Gastrointestinal symptoms. In T. R. Tams (Ed.), *Handbook of small animal gastroenterology* (pp. 44-45). Saunders.

Hall, E. J., & Day, M. J. (2017). Diseases of the small intestine. In S. J. Ettinger, E. C. Feldman, & E. Côté (Eds.), *Textbook of veterinary internal medicine: Diseases of the dog and the cat* (8th ed., p. 3669). Elsevier.