

Erfolgversprechendes Futter

TIPPS FÜR EINE EFFEKTIVE AUSSCHLUSSDIÄT


Ihnen wurde eine Eliminationsdiät oder auch Ausschlussdiät für Ihr Haustier empfohlen, um die mögliche Ursache der dermatologischen oder gastrointestinalen Symptome Ihres Haustiers zu diagnostizieren. Bei einer Ausschlussdiät handelt es sich um einen diagnostischen Test, ähnlich einem Bluttest oder einer Röntgenuntersuchung. Dabei ist für die nächsten ____ bis ____ Wochen eine Fütterung ausschließlich der folgenden Futtermittel bzw. nur in Kombination mit den empfohlenen Snacks vorgesehen:

Empfohlene Optionen für Futter, Snacks und Medikamentengabe		
Markenname und Zusammensetzung	Menge pro Mahlzeit	Häufigkeit


Richtlinien und Tipps für die Ausschlussdiät

Wie bei allen diagnostischen Tests muss eine Ausschlussdiät korrekt durchgeführt werden, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Daher sollten die folgenden Richtlinien strikt eingehalten werden:

- **Stellen Sie Ihr Haustier auf das empfohlene Futter um.** Es kann entweder sofort zum neuen Futter gewechselt oder eine schrittweise Umstellung durchgeführt werden. Wird eine schrittweise Umstellung empfohlen, schleichen Sie das neue Futter über einen Zeitraum von 7 Tagen ein. Nachfolgend sehen Sie Umstellungspläne für Hunde und Katzen.



HUNDE



KATZEN

Richtlinien und Tipps für die Ausschlussdiät

- **Während der Ausschlussdiät dürfen Sie ausschließlich das empfohlene Futter geben** und nur frisches Wasser anbieten. Es dürfen keine anderen Nahrungsmittel, Futtersorten oder Snacks gefüttert werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich vorgesehen. Wenn als Belohnung oder im Training Snacks erforderlich werden, sollten Sie nur das Futter oder die Snacks verwenden, die von Ihrem Tierarzt empfohlen wurden. Informieren Sie Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn, dass Ihr Haustier eine spezielle Diät macht, damit es nicht versehentlich Futter oder Snacks erhält, die die Ausschlussdiät beeinflussen. Das Füttern anderer Nahrungsmittel kann die Interpretation der Ergebnisse der Ausschlussdiät beeinträchtigen.
- **Kontrollieren Sie den Zugang zu anderen Nahrungsmitteln**, insbesondere wenn andere Haustiere oder kleine Kinder im Haushalt leben. Das Fressen von Futtersorten eines anderen Haustieres, Kot oder Essensresten kann die Ausschlussdiät behindern.
 - Andere Haustiere derselben Art können mit demselben Futter oder getrennt in einem anderen Raum gefüttert werden.
 - Haustiere verschiedener Arten sollten in getrennten Räumen gefüttert werden.
 - Wenn Ihr Haustier dazu neigt, heruntergefallene Essensreste von Kindern zu fressen, sollte es sich während der Mahlzeiten in einem anderen Raum aufhalten. Lassen Sie Ihr Haustier nach den Mahlzeiten keine Teller ablecken.
 - Sammeln Sie Kot unverzüglich ein und entsorgen Sie ihn sicher. Wenn Ihr Hund im Freien gerne den Kot anderer Tiere frisst, halten Sie ihn bei Spaziergängen und Wanderungen an der kurzen Leine. Möglicherweise müssen Sie Ihren Hund auch von Katzentouiletten fernhalten.
- **Berücksichtigen Sie alle Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel**, unabhängig davon, ob sie aromatisiert oder geschmacksneutral sind. Dazu gehören aromatisierte Medikamente, wie z. B. monatlich verabreichte (Kau-)Tabletten zum Schutz vor Herzwürmern, Darmparasiten, Flöhen und Zecken, aromatisierte oder kaubare Antibiotika, Zahnpasta und Nahrungsergänzungsmittel (z. B. Vitamine oder Mittel für die Haut-, Fell- oder Gelenkgesundheit).
 - Medikamente zur Flohprophylaxe und Herzwurmprävention müssen unbedingt weiterhin gegeben werden. Einige aromatisierte Medikamente sind auch als geschmacksneutrale Tabletten oder Kapseln oder in alternativen Formen wie äußerlich angewendete Mittel oder injizierbare Medikamente erhältlich. Fragen Sie uns nach der besten Option für Ihr Haustier.
 - Sofern Ihr Tierarzt keine anderweitigen Anweisungen gibt, sollten geschmacksneutrale Tabletten nicht in Hot Dogs, Käse, Brot oder anderen Nahrungsmitteln außer der empfohlenen Nahrung versteckt werden.
- **Planen Sie Futterkäufe** möglichst, bevor das Futter zur Neige geht. Zu Beginn sollten Sie ausreichend Futter für mindestens ____ Wochen vorrätig haben. Wichtig ist, das Futter während der Ausschlussdiät nicht zu wechseln, da dies die Ergebnisse beeinträchtigen kann. **Store the recommended diet in its original packaging**, even if you store the bag of food in another storage container. Thoroughly wash all food storage containers and serving dishes to minimize risk of cross contamination. Make sure the food is sealed and stored in a cool, dry location to avoid food spoilage or contamination.
- **Lassen Sie Katzen nicht nach draußen**, sofern möglich, um das Jagen und damit die Aufnahme „zusätzlicher“ Proteine zu vermeiden.
- **Halten Sie in einem Tagebuch die klinischen Symptome Ihres Haustiers fest**, wie z. B. Kratzen, Beißen, Lecken, Reizungen oder Verletzungen der Haut, weicher Kot, Durchfall, Veränderung des Appetits oder Erbrechen. Das Tagebuch ist auch hilfreich, wenn Ihr Haustier versehentlich anderes Futter, Snacks oder aromatisierte Medikamente zu sich nehmen sollte. Anhand dieser Informationen können wir die Wirksamkeit der Ausschlussdiät besser beurteilen.
- **Bitte kontaktieren Sie uns und fragen Sie nach Anweisungen**, wenn Ihr Haustier:
 - erbricht oder Durchfall hat.
 - sich weigert, das neue Futter zu fressen.
 - seit mehr als 3 Tagen keinen Kot abgesetzt hat.
 - an Gewicht zu verlieren oder zuzunehmen scheint.

Die Symptome Ihres Haustiers verbessern sich möglicherweise nur langsam und es kann ____ bis ____ Wochen dauern, insbesondere wenn Ihr Haustier weitere gesundheitliche Probleme hat. Beachten Sie zudem, dass eine vollständige Ausschlussdiät ____ bis ____ Wochen dauern kann.

Eine Ausschlussdiät kann eine Herausforderung darstellen, ist aber wichtig, um festzustellen, ob die klinischen Symptome Ihres Haustiers auf eine Futtermittelunverträglichkeit zurückzuführen sind. Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Probleme oder Fragen haben.